

ADDITIONS A LA FLORE DE L'A. E. F. ;
APOCYNACÉES-ÉCHITOÏDÉES.

Par M. PICHON.

Cette liste fait suite à celle des Pluméroïdées donnée quelques pages plus haut.

PLEIOCERAS ZENKERI Stapf.

Gabon : Oyem, *Le Testu* 9475 (2-2-1934 ; fl.).

Nouveau pour l'A. E. F. Répartition : Nigéria du Sud, Cameroun.

ALAFIA SCHUMANNII Stapf. — *Holalafia Schumannii* (Stapf) Woodson.

Oubangui-Chari : Boukoko, forêt, *Tisserant* 1388 (24-2-1949 ; fl.).

Nouveau pour l'Oubangui. Répartition : Côte d'Ivoire, Nigéria du Sud, Cameroun, Gabon, Congo belge.

ALAFIA GRANDIS Stapf. — *Tabernaemontana erythrophthalma* K. Sch. ex Stapf.

Oubangui-Chari : forêt de Mbaïki, vern. « fotibi » (lissongo), *Tisserant* 3742 (3-1945 ; fl.) ; Boukoko, forêt, vern. « fotibi » et « molo-mboka » (lissongo), *Tisserant* 390 (23-10-1947 ; fl.), 559 (20-12-1947 ; fl.), 1928 30-10-1950 ; fr.).

Nouveau pour l'A. E. F. Répartition : Cameroun français.

BAISSEA AXILLARIS (Benth.) Hua. — *Zygodia axillaris* Benth.

Oubangui-Chari : à 60 km. au S de Bria, forêt de plateau, *Tisserant* 2451 (12-3-1928 ; fl.).

Congo français : Kitabi, *Lecomte* B-81 (12-1893 ; fl.), B-181 (12-1893 ; b. j.).

Nouveau pour l'A. E. F. Répartition : Dahomey¹, Nigéria du Sud, Cameroun, Congo belge, Angola.

BAISSEA OGOWENSIS Hua.

Oubangui-Chari ou Congo français : forêt de Baïki-Boubangui, Boganga et confluent Oubangui-Congo, *Fidao* s. n. (12-1916 ; fl.).

Congo français : Kitabi, *Lecomte* s. n. (fr.).

1. Où il est nouveau : Dogba, bords de l'Ouémé, terrain argileux humide, *Le Testu* 233 (5-1-1902 ; fl. et fr.).

Nouveau pour le Congo français et, avec doute, pour l'Oubangui.
Répartition : Gabon.

BASSESA LEONENSIS Benth.

Oubangui-Chari : Boukoko, forêt, vern. « mombwendu » (lissongo),
Tisserant 311 (4-10-1947, fl. ; — 17-10-1947, fr. j. ; — 20-10-1947, fr.).

Nouveau pour l'Oubangui. Répartition : Guinée française, Sierra Leone, Libéria, Côte de l'Or, Nigéria du Sud, Cameroun¹, Gabon².

MOTANDRA LUJAEI De Wild. et Dur.

Gabon : Mimvoul, vern. « singôlo », *Cottes* s. n. (30-8-1906 ; fl.).

Nouveau pour l'A. E. F. Répartition : Congo belge.

ONCINOTIS CAMPANULATA K. Sch. — *O. glandulosa* Stapf.

Oubangui-Chari : Boukoko, forêt, vern. « molo-tiki » (lissongo), *Tisserant* 184 (1-9-1947 ; fl.), 444 (6-11-1947 ; fr. j. ; détermination douteuse), 915 (13-5-1948 ; fl.), 1072 (10-8-1948 ; fl.), *Carp.-20* (31-5-1948 ; fr.), *Carp.-62* (12-1950 ; fr.).

Nouveau pour l'Oubangui. Répartition : Guinée française, Côte de l'Or, Nigéria, Cameroun, Gabon, Congo belge.

ONCINOTIS HIRTA Oliv.

Oubangui-Chari : Mbaïki, près de la mission, dans les buissons, *Tisserant* 3783 (3-7-1947 ; fl.) ; Boukoko, forêt claire, vern. « wali-tiki » (lissongo), *Tisserant* 317 (6-10-1947 ; fl.).

Nouveau pour l'Oubangui. Répartition : Gabon, Congo français, Congo belge, Angola³.

Laboratoire de Phanérogamie du Muséum.

1. Où il est nouveau : Bipindi, forêt vierge, *Zenker* 367 $\frac{1}{2}$ (1908 ; fl.).

2. Il existe dans l'Oubangui au moins deux autres espèces de *Baissea*, que, faute de matériel de comparaison, nous n'avons pu déterminer avec certitude. L'une ressemble beaucoup à *B. caudiloba* Stapf [Boukoko, bord de forêt, *Tisserant* 1180 (7-10-1948 ; fr. j.), 1423 (31-3-1949 ; fl.), 2099 (9-5-1951 ; fr. j.)], l'autre à *B. Welwitschii* (H. Bn.) Stapf ex Hiern [Boukoko, bord de forêt, *Tisserant* 533 (7-10-1948 ; fr. j.)].

3. La présence en Oubangui de l'*O. gracilis* Stapf, signalée avec doute par le P. Tisserant [Cat. Fl. Oub.-Ch. ; in Mém. Inst. Et. Centrafr., II (1950), 22], se confirme : Boukoko, forêt claire, vern. « molo-bilibo », *Tisserant* 788 (19-3-1948) ; fl.)

Il existe encore en Oubangui un autre *Oncinotis*, seul de son espèce dans l'herbier du Muséum, et qui semble cadrer parfaitement avec la diagnose de l'*O. obovata* De Wild., du Congo belge : Boukoko bord de forêt, *Tisserant* 376 (16-10-1947 ; fl.).